



برنامج تحصينات المدارس لعام 2019 لطلاب الصف العاشر ضد مرض التهاب المكورات السحائية ACWY

قد يصيب مرض التهاب المكورات السحائية أي فئة عمرية. ومع هذا، تأتي أعلى معدلات الإصابة وحمل المرض بين المراهقين، ويمكن أن تنقل هذه الفئة العمرية البكتيريا لمن حولها ممن يكون خطر الإصابة لديهم مرتفعاً، منهم الأطفال الصغار.

ومن المتوقع أن يقلل تطعيم طلاب الصف العاشر من معدلات انتقال البكتيريا المسببة لهذا المرض للأخرين، ويقلل الإصابة في المجتمعات الأكبر.

ما هو الطعم الذي سيتم استخدامه وما مدى فاعليته؟

سيتم استخدام تطعيم التهاب المكورات السحائية ACWY. وهذا التطعيم يحمي من الإصابة من أربع مجموعات Serogroups من بكتيريا التهاب المكورات السحائية: A، C، W، و Y. يستخدم الطعم Nimenrix® من إنتاج شركة فايزر في هذا البرنامج داخل المدارس.

هذه التطعيمات آمنة وفعالة. تم تطبيق برامج التحصينات من التهاب المكورات السحائية ACWY على المراهقين من أعمار 13-15 في المملكة المتحدة منذ عام 2015، والمراهقين من 11-12 في الولايات المتحدة بدون مشكلات تذكر. ويتم أخذ التطعيم بشكل دوري كجرعة واحدة. وهناك جرعات أخرى يوصى بها لمن هم عرضة للإصابة بشكل أكبر والمسافرين للأماكن التي ينتشر فيها المرض. وقد أوضحت الدراسات أن فاعلية تطعيمات التهاب المكورات السحائية ACWY تتراوح بين 80-85 بالمائة في المراهقين.

ما هو مرض التهاب المكورات السحائية؟

إن مرض التهاب المكورات السحائية ليس من الأمراض الشائعة، ولكنه أحياناً يكون مهدداً للحياة. و يأتي هذا المرض نتيجة للعدوى البكتيرية بالدم و/أو الأغشية المبطنة للحنج والشفوي والمخ.

وبالرغم من إمكانية علاجه باستخدام المضادات الحيوية، يمكن أن يتطور هذا المرض بشكل سريع للغاية، ولذا فمن المهم في حالة ظهور أعراض التهاب المكورات السحائية على أي شخص طلب المشورة الطبية فوراً.

في العادة، يحمل 10 أشخاص أصحاء تقريباً البكتيريا المسببة لالتهاب المكورات السحائية دون أن يتعرضوا للضرر في الأنف أو الحلق، ولا يصابون بالمرض.

كيف يصاب الشخص بمرض التهاب المكورات السحائية؟

تنتشر بكتيريا التهاب المكورات السحائية في الإفرازات التنفسية (السعال، والعطس، أو التقبيل). ولا تعيش البكتيريا أكثر من بضع ثوان في البيئة.

ومن الشائع أن ينتشر المرض بين الذين يقربون جداً من حامل البكتيريا، مثل الذين يعيشون في المنزل نفسه، وممارسي الجنس، والأطفال الذين يذهبون لدار الرعاية نفسها لأكثر من أربع ساعات متواصلة.

لماذا تقوم إدارة الصحة بولاية غرب أستراليا بطرح برنامج التحصينات لطلاب الصف العاشر؟

سجلت مؤخراً زيادة في معدل الإصابة بالتهاب المكورات السحائية الذي يسببه نوع معين من البكتيريا "Serogroup W".

ماذا لو حدث تفاعل عكسي خطير – ما الذي يجب أن أبحث عنه؟

إبحث عن أي شيء يقلقك، مثل علامات تفاعلات حساسية خطيرة، أو ارتفاع شديد في الحرارة، أو سلوك غير طبيعي. ويمكن أن تتضمن علامات تفاعل الحساسية الشديد القشعريرة، أو التورم في الوجه والحنجرة، أو صعوبة في التنفس، أو سرعة في ضربات القلب، أو الدوخة، أو الضعف – وعادة ما تستمر لمدة بضع ساعات بعد تناول التطعيم. وفي حالة حدوث أي من أعراض تفاعلات الحساسية الشديدة، اتصل بالإسعاف أو اذهب إلى إدارة الطوارئ الأقرب لك.

ما الذي يجب علي فعله؟

يمكن أن يقلل الباراسيتامول من أعراض الحمى البسيطة، أو الألم. استخدم قطعة قماش مبللة بماء بارد لتخفيف الألم في موقع الحقن. يرجى طلب المشورة الطبية أو الذهاب إلى إدارة الطوارئ الأقرب لك إذا حدث أي تفاعل تعتقد أنه قد يكون خطيراً أو غير متوقع.

أو اتصل على **healthdirect Australia** على الرقم 1800 022 222.

ينبغي الإبلاغ عن التفاعلات لإدارة

Western Australian Vaccine Safety Surveillance (WAVSS).

ويجب أن يقوم مقدم الخدمة برفع هذا البلاغ، أو يمكنك أن تقوم بذلك بنفسك من خلال موقع WAVSS

www.wavss.health.wa.gov.au أو على رقم

9321 1312 من 8:30 صباحاً – 4:30 مساءً أيام الأسبوع.

لمزيد من المعلومات

إذا كانت لديك أي أسئلة حول تطعيمات التهاب المكورات السحائية، اتصل بـ **healthdirect Australia** على الرقم 1800 022 222 أو بمزود الخدمة المحلي لديك من خلال تفاصيل الإتصال المرفقة على ظهر الظرف الخاص بأوراق موافقتك.

من الذين يفترض بهم عدم أخذ هذا التطعيم؟

أخبر الشخص المسؤول عن تطعيمك إذا كنت:

* **تعاني من أي أنواع حساسية خطيرة أو تسبب خطراً على الحياة** إذا كنت تعاني من حساسية تمثل خطراً على حياتك بعد تعاطي جرعة سابقة من تطعيم التهاب المكورات السحائية ACWY، أو إذا كنت تعاني من تفاعل حساسية لأي من مكونات هذا التطعيم، فينبغي عليك ألا تأخذه. يمكن لمقدم الخدمة أن يخبرك بمكونات التطعيم.

* حامل أو مرضع

لا ينصح بإعطاء الحامل أو المرضع تطعيم التهاب المكورات السحائية، ولكن يمكن ذلك إذا وصفه الطبيب. يرجى مناقشة المزيد مع الممارس العام المتابع لحالتك إذا كنت حامل أو مرضع.

ما هي الآثار الجانبية للتطعيم؟

بالنسبة لأي دواء، بما فيها التطعيمات، هناك احتمال حدوث تفاعلات عكسية. وغالباً ما تكون بسيطة وتختفي من تلقاء نفسها. كما أن هناك احتمال وجود بعض التفاعلات الخطيرة، ولكنها نادرة. هناك احتمال بعيد أن يتسبب التطعيم في حدوث إصابة خطيرة أو الوفاة. لا يمكنك أن تصاب بمرض التهاب المكورات السحائية بسبب التطعيم.

تتضمن التفاعلات العكسية الشائعة: الألم، والاحمرار، والتورم في مكان التطعيم، والحمى، والتهيج، والدوار، وفقدان الشهية، والصداع، والالتهاب، والغثيان. ومع هذا، فحدوث التفاعلات العكسية الخطيرة يعد نادر الحدوث.

يتم دائماً مراقبة أمان وسلامة التطعيم.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.tga.gov.au أو

www.immunise.health.gov.au



يمكن أن تتوفر هذه الوثيقة بأشكال بديلة حسب الطلب للأشخاص ذوي الإعاقة.

Produced by the Communicable Disease Control Directorate
© Department of Health 2019

Copyright to this material is vested in the State of Western Australia unless otherwise indicated. Apart from any fair dealing for the purposes of private study, research, criticism or review, as permitted under the provisions of the Copyright Act 1968, no part may be reproduced or re-used for any purposes whatsoever without written permission of the State of Western Australia.